

ORIENTAÇÕES SOBRE SUSPENSÃO DE ANTICOAGULANTES E ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS ANTES DE COLONOSCOPIA

Suspender medicamentos que alteram a coagulação do sangue, conforme orientações abaixo.

SEMPRE consultar cardiologista ou outro especialista que tenha prescrito o medicamento antes de suspendê-lo. Estas são orientações gerais que podem ser adaptadas ao caso do paciente.

- Ticlopidina (Ticlid®), Clopidogrel (Plavix®, Clopin®) e Ticagrelor (Brilinta®): Suspender 7 dias antes do procedimento.
- Dabidatran (Pradaxa®), Rivaroxaban (Xarelto®), Apixaban (Eliquis®) e Edoxaban (Lixiana®): Suspender 2 dias antes do exame. Se insuficiência renal, tomar a última dose do Dabidatran (Pradaxa) 5 dias antes do procedimento.
- Varfarina (Marevan®, Coumadin®): Suspender 5 dias antes do procedimento. Checar se o RNI está abaixo de 1,5 antes do exame.
- Enoxaparina (Clexane®) e Nadroparina (Fraxiparina®): Suspender 24 horas antes do procedimento.
- Fondaparinux (Arixtra®): Suspender 48 horas antes do procedimento.
- Aspirina (AAS): Pode manter o uso se tiver sido prescrito por médico.

Em caso de dúvidas, ligar para GEDCENTER: (32) 3311-7070